

Calendario de Vacunación

Calendario de vacunaciones recomendado por SAP - AÑO 2009								
Edad	BCG	Hepatitis A (HA)	Hepatitis B (HB)	Sabin (OPV)	Cuádruple (DTP-Hib)	Triple Bacteriana (DTP)	Triple Viral (SRP)	Doble Adultos (dT _a)
Recién Nacido	1ra. Dosis *		1ra. Dosis **					
2do. mes			2da. Dosis	1ra. Dosis	1ra. Dosis			
4to. mes				2da. Dosis	2da. Dosis			
6to. mes			3ra. Dosis	3ra. Dosis	3ra. Dosis			
12do. mes		1ra. Dosis					1ra. Dosis	
18vo. mes				4ta. Dosis	4ta. Dosis			
6 Años				Ref.		Ref.	2da. Dosis	
11 Años			Iniciar o completar esquema ***				Ref. ****	
16 años								Ref.
Cada 10 años								Ref.
Embara-zadas	Doble adultos dTA , 2 dosis a partir del 5to mes de embarazo, 1er. Refuerzo al año y 1 dosis cada 10 años							
Post-parto y post-aborto inmediato	Indicar una dosis de vacuna doble viral por única vez. En la literatura se menciona evitar en lo posible el embarazo en el primer mes post vacunación, pero si esto ocurriera se debe señalar que la situación no entraña riesgo para el recién nacido. La estrategia de vacunación para la prevención de rubéola y el control acelerado de SRC se complementará con la vigilancia integrada de rubéola-sarampión y un registro de casos de SRC a los fines de objetivar el impacto de la enfermedad y monitorear las estrategias de vacunación.							

* Antes del egreso de la maternidad.

** Preferentemente en las primeras 12hs. de vida. El Recién Nacido prematuro con peso menor a 2000gr. debe recibir la dosis neonatal (dentro de las 12hs. de vida) y 3 dosis más: a los 2, 4 y 6 meses.

*** Si no recibió el esquema en la infancia, se aplicará el esquema de vacuna contra la hepatitis B con tres dosis pediátricas, la primera en momento 0, la segunda al mes de la primera y la tercera dosis a los 6 meses de la primera.

**** Si no recibió previamente dos dosis de triple viral o bien de triple viral + 1 dosis de doble viral (Sarampion + Rubeola)

BCG: Tuberculosis

HA:Hepatitis A

HB:Hepatitis B

DTP-Hib (Cuádruple) difteria, tétanos, pertussis, Haemophilus influenzae b

OPV (Sabin): vacuna poliomielítica oral

DTP (Triple bacteriana): difteria, tétanos, pertussis

SRP (Triple viral): sarampión, rubéola, parotiditis

SR (Doble viral): sarampión, rubéola

dT (Doble bacteriana): difteria, tétanos

Ref: Refuerzo

Fuente SAP